



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
Завод за јавно здравље Панчево
Пастерова 2, 26000 Панчево
Тел.Факс. 013/322-965, е-маил: info@zjzpa.org.rs

ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
Одељење хигијене

СЕЗОНСКИ ИЗВЕШТАЈ

**О ИЗВРШЕНИМ МЕРЕЊИМА АЛЕРГЕНОГ ПОЛЕНА
У АМБИЈЕНТАЛНОМ ВАЗДУХУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА
31.01.2022. - 01.05.2022. године**

Број: ПЛ 18

Датум: 13.05.2022.

Увод

Завод за јавно здравље Панчево је по основу Уговора о набавци услуге мониторинга полена за 2022. и 2023. годину број 01-745/5-2021 од 21.01.2022. године са Градском управом града Панчево, извршио узорковање и испитивање аероалергеног полена у периоду сезоне фебруар – мај 2022. године.

Аерополен је битан узрочник алергијских реакција током последњих 50 година, а резултати мониторинга аерополена омогућавају проучавање, превенцију, дијагностиковање, па и лечење поленских алергија.

У Србији је на основу Закона о заштити животне средине полен због негативног и штетног утицаја на здравље људи окарактерисан као полутант емитован из природе. Начин да се помогне особама алергичним на полен (који је препоручен од стране Светске здравствене организације) је организовање и спровођење континуираног мерења концентрације полена у ваздуху.

Полен биљака је за човека један од најзначајнијих алергена у ваздуху. Поленова зрна код више од 20% људске популације изазивају алергијске реакције (bronхитис, коњуктивитис, дерматитис, поленска кијавица), док у случају дуготрајног и вишегодишњег излагања високим концентрацијама један део људске популације оболева од хроничног бронхитиса и бронхијалне астме. Загађеност ваздуха у урбаним, индустријским срединама доприносе појачаном алергијском дејству аерополена. Светска здравствена организација је упозорила да ће различите врсте алергијских реакција код људи бити болест савременог човечанства у 21. веку.

Негативан утицај на здравље људи, који изазива полен појединих биљних врста, сврстава ове честице у природне, биолошке загађујуће материје у ваздуху. Полен може бити ношен ветром на удаљеност и до 50km. Концентрација полена биљака у ваздуху зависи од низа фактора који владају у природним стаништима и урбаним срединама. Веома је важно познавање временске и просторне дистрибуције, као и врсте аероалергеног полена, како би се пратило кретање полена у ваздуху, прогноза за наредни период и како би се проценио утицај полена за здравствено стање становништва. Годишњи подаци се сумирају у календар полена и он се користи у превенцији сензибилисаних особа, као помоћ у ефикаснијем лечењу пацијената у здравственим институцијама, побољшању рада комуналних и урбанистичких служби на уништавању трава и корова које су узрочници алергијских болести, бољем сагледавању потребе увођења законске регулативе, укључивању и међународну сарадњу, јер су проблеми аерополена не само локалног, регионалног него и глобалног карактера.

Мерно место и период узорковања полена

Мерење концентрације полена 24 алергене биљне врсте у ваздуху обавља се у оквиру систематског праћења концентрације полена на територији Града Панчева, у оквиру државне мреже за мониторинг алергеног полена који врши Агенција за заштиту животне средине.

Вредности концентрације полена у ваздуху мере се на висини од око 15m изнад површине тла, а уређај за узорковање је постављен на крову зграде Градске Управе града Панчева. Временски период континуираног узимања узорака почиње почетком фебруара и

траје до првих новембарских дана, мада у зависности од временских услова овај интервал може да варира.

Мерна станица за мониторинг полена у Панчеву обухвата територију општина Алибунар, Ковачица, Ковин, Опово и Панчево. Обољења која се најчешће повезују са негативним утицајем полена на здравље су алергијска астма, алергијски ринитис и алергијски конјуктивитис, те се подаци о обољевању од ових болести прикупљају на нивоу примарне и на нивоу секундарне здравствене заштите.

Гранична вредност за све алергене биљке изузев амброзије је 60 поленових зрна/ m^3 ваздуха, а за амброзију 30 поленових зрна/ m^3 ваздуха.

Због нешто топлије зиме, полинација (која почиње цветањем дрвећа) је почела раније него што је то уобичајено, тако да су прва поленова зрна на територији Панчева регистрована већ 31.01.2022. године.

Резултати испитивања полена

У тромесечном периоду мерења, од 31.01.2022. - 01.05.2022. године, доминирали су најпре полени дрвећа, што је и уобичајено за овај период године, да би крајем периода почела и полинација трава и коприва, чија пуна полинација и повишене концентрације полена у ваздуху тек предстоје.

Полен брезе испољава најјаче дејство од свих алергена у овом периоду. Полен брезе је у овом тромесечју био у повишеним концентрацијама 11 дана. Највећи дневни пик регистрован је 09.04.2022. са 457 поленових зрна/ m^3 ваздуха. Прва поленова зрна брезе у ваздуху забележена су 14.02.2022. године и регистрована су све до 29.04.2022. године. Полен брезе је детектован 44 дана и његова укупна концентрација за овај период је била 2494 зрна/ m^3 ваздуха.

Леска – прва поленова зрна леске су детектована 31.01.2022. и њен полен је регистрован до 18.04.2022. Полен леске је детектован током 57 дана, а концентрација поленових зрна у ваздуху је била изнад граничних вредности један дан. Највећа вредност концентрације полена леске забележена је 17.02.2022. и износила је 73 поленова зрна/ m^3 ваздуха. Током ове сезоне полинације, укупна концентрација полена леске је била 660 поленова зрна/ m^3 ваздуха.

Јова – прва поленова зрна јове су детектована 31.01.2022. током укупно 54 дана, до 27.03.2022. године. Концентрација полена јове у ваздуху је прелазила граничне вредности 3 дана. Највећа концентрација полена забележена је 17.02.2022. и износила је 358 поленових зрна/ m^3 ваздуха. Укупна концентрација полена јове за ову сезону је износила 963 поленова зрна/ m^3 ваздуха.

Тисе и чемпреси су почели да цветају 31.01.2022. и детектовани су до краја овог тромесечног периода, до 28.04.2022. Полинација тиса и чемпреса трајала је 80 дана. Концентрације овог алергеног полена су 17 дана биле изнад граничних вредности. Највиша концентрација полена тиса и чемпреса постигнута је 25.02.2022. и износила је 1143 поленових зрна/ m^3 ваздуха. Укупна концентрација полена у сезони је износила 5417 поленових зрна/ m^3 ваздуха.

Брест је почео да цвета 14.02.2022. и његов полен је регистрован до 13.04.2022. Полинација бреста трајала је 45 дана. Концентрација овог алергеног полена није прелазила граничне вредности. Највиша концентрација полена бреста детектована је 17.03.2022. године

и износила је 22 поленових зрна/ m^3 ваздуха. Укупна концентрација полена бреста је износила 208 поленових зрна/ m^3 ваздуха.

Топола је почела да цвета 11.02.2022. и детектована је до 24.04.2022. Полинација тополе је трајала 58 дана. Концентрације овог алергеног полена су биле изнад граничних вредности 2 дана. Највиша концентрација полена тополе постигнута је 23.03.2022. и износила је 78 поленова зрна/ m^3 ваздуха. Током ове сезоне полинације, укупна концентрација полена тополе је износила 466 поленова зрна/ m^3 ваздуха.

Јавор је са цветањем почео 14.02.2022. и емитовао је полен све до краја ове сезоне, до 27.04.2022. Полинација јавора у овом периоду је трајала 36 дана. Концентрације овог алергеног полена су 3 дана прелазиле граничне вредности. Највиша концентрација полена јавора достигнута је 31.03.2022. и износила је 73 поленових зрна/ m^3 ваздуха. Укупна концентрација полена јавора је износила 508 поленова зрна/ m^3 ваздуха.

Врба је почела да цвета 25.02.2022. и њена поленова зрна су детектована у ваздуху током целе ове сезоне, до 29.04.2022. Полинација врбе је трајала 50 дана. Концентрације овог алергеног полена су 8 дана биле изнад граничних вредности. Највиша концентрација полена врбе постигнута је 09.04.2022. и износила је 736 поленова зрна/ m^3 ваздуха. Укупна концентрација полена врбе је износила 2227 поленова зрна/ m^3 ваздуха.

Јасен је почео да цвета 14.02.2022. и његов полен је детектован у ваздуху до 01.05.2022. Полинација јасена у овом периоду је трајала 70 дана. Концентрација поленових зрна овог алергеног полена није била изнад граничних вредности. Највиша забележена концентрација полена јасена је била 17.02.2021. и износила је 44 поленових зрна/ m^3 ваздуха. Укупна концентрација полена јасена је износила 355 поленових зрна/ m^3 ваздуха.

Граб је почео да цвета 09.02.2022. и његов полен емитован је до 29.04.2022. године. Полинација граба је трајала 56 дана. Концентрације овог алергеног полена су биле изнад граничне вредности 4 дана. Највиша концентрација полена граба постигнута је 30.03.2022. и износила је 240 поленових зрна/ m^3 ваздуха. Током ове сезоне полинације, укупна концентрација полена граба је износила 1033 поленових зрна/ m^3 ваздуха.

Платан је почео да цвета 06.04.2022. и његов полен у ваздуху емитован је до 29.04.2022. године. Полинација платана је трајала 22 дана, а концентрација овог алергеног полена није прешла граничну вредност. Највиша концентрација полена платана детектована је 15.04.2022. и износила је 15 поленових зрна/ m^3 ваздуха. За овај период полинације, укупна концентрација полена платана је износила 69 поленових зрна/ m^3 ваздуха.

Орах је са цветањем почео 11.04.2022. и емитовао је полен до краја ове сезоне, до 29.04.2022. Полинација ораха трајала је 18 дана, а концентрација овог алергеног полена није било изнад граничних вредности. Највиша концентрација полена ораха постигнута је 25.04.2022. и износила је 29 поленових зрна/ m^3 ваздуха. Укупна концентрација полена ораха је износила 191 поленобо зрно/ m^3 ваздуха.

Храст је почео да цвета 27.03.2022. и његова полинација је трајала 19 дана у току ове сезоне. Полен овог алергена је регистрован у ваздуху до краја овог периода. Концентрације полена храста нису биле изнад граничних вредности у овој сезони цветања. Највиша концентрација полена храста постигнута је 24.04.2022. године и износила је 24 поленових зрна/ m^3 ваздуха. Укупна концентрација полена храста је износила 109 поленових зрна/ m^3 ваздуха.

Четинари – прва поленова зрна су детектована 02.02.2022. и трајала је до краја ове сезоне, до 29.04.2022. Њихова полинација је трајала 16 дана и за то време концентрације полена борова у ваздуху нису прелазиле граничне вредности. Највиша концентрација полена борова постигнута је 29.04.2022. и износила је 4 поленових зрна/ m^3 ваздуха. Укупна концентрација полена бора је износила 24 поленова зрна/ m^3 ваздуха.

Дуд је са цветањем почео 05.04.2022. и његов полен је регистрован у ваздуху до краја ове сезоне, до 29.04.2022. Полинација дуда је трајала 10 дана. За то време концентрације овог алергеног полена нису биле изнад граничних вредности. Највиша постигнута концентрација од 45 поленових зрна/ m^3 ваздуха, 27.04.2022. У овој сезони полинације укупна концентрација полена дуда је износила 164 поленових зрна/ m^3 ваздуха.

Буква је са цветањем почела 06.04.2022. године. Њихова полинација је трајала 20 дана и за то време концентрације полена букве у ваздуху нису прелазиле граничне вредности. Детектовано је укупно 229 поленових зрна, максимална концентрација износила је 59 поленових зрна / m^3 ваздуха, на дан 22.04.2022. године.

Траве су почеле да цветају 05.04.2022. и њихов полен у ваздуху емитован је до 28.04.2022. године. Полинација трава је у овом периоду трајала 12 дана. У овој сезони полен трава није прелазео граничне вредности, а највиша постигнута концентрација била је 5 поленових зрна/ m^3 ваздуха, а забележена је 24.04.2022. У овој сезони полинације укупна концентрација полена траве је износила 19 поленових зрна/ m^3 ваздуха.

Од корова је регистрован полен **коприве** 08.04.2022. Полинација коприве је за трајала 9 дана и за тај период концентрација овог полена није била изнад граничних вредности за дан. Највиша вредност концентрације полена од 2 поленова зрна/ m^3 ваздуха је постигнута 08.04.2022. године. Полинација коприве је у овом периоду трајала 9 дана.

Процена утицаја на здравље становништва

Степен здравственог ризика је дат на основу концентрација полена у ваздуху: граничне вредности концентрације полена са ниским степеном ризика су до 60 поленових зрна/ m^3 (за полен амброзије до 30 поленових зрна/ m^3), са средњим степеном ризика су концентрације од 60 поленових зрна/ m^3 (за полен амброзије од 30 поленових зрна/ m^3) и концентрације са високим ризиком по здравље становништва су више од 100 поленових зрна/ m^3 , (за полен амброзије од такође више од 100 поленових зрна/ m^3). Ниске концентрације полена у ваздуху могу изазвати алергијске реакције код изузетно осетљивих особа. Умерено високе концентрације (средњи степен ризика) могу изазвати алергијске реакције код алергичних особа и високе концентрације могу изазвати веома јаке алергијске реакције.

Од детектованих врста малу алергеност поленовог зрна имају полен јавора, граба, букве, дуда, четинара, врбе и бреста; средњу алергеност поленовог зрна имају леска, тисе и чемпреси, јасен, орах, платан, топола, храст и високу алергеност поленовог зрна има јова, бреза, трава и коприва.

У првој сезони полинације 2022. године детектован је полен 18 биљних врста. Полен јове, брезе, граба, тисе и чемпреса и врбе су детектовани у концентрацијама које носе висок здравствени ризик. Полен јавора, леске и тополе је регистрован у концентрацијама које представљају умерен ризик, а полен осталих биљних врста је био присутан у концентрацијама са ниским здравственим ризиком.

Прекорачења граничних вредности концентрација полена **јове** (1 дан), **брезе** (8 дана), **чемпреса** (15 дана), **граба** (2 дана) и **врба** (4 дана) су имала високи здравствени ризик за општу популацију.

Обољевање становништва од алергијских болести и процена утицаја полена у ваздуху на здравље становништва града Панчево су приказани у табелама 1. и 2.

Табела 1. Укупан број оболелих од алергијских болести у Општој болници Панчево и дому здравља Панчево

	Алергијска астма	Алергијски ринитис	Алергијски конјуктивитис
Општа болница Панчево	569	692	53
Дом здравља Панчево	325	244	232

Табела 2. Корелација концентрација полена у ваздуху и алергијских обољења у примарној и секундарној здравственој заштити на територији града Панчево

	Примарна здравствена заштита			Секундарна здравствена заштита		
	Астма	Ринитис	Конјуктивитис	Астма	Ринитис	Конјуктивитис
Acer / јавор	0,123	0,562	0,552	0,409	0,300	0,072
Alnus / јова	0,003**	0,343	0,133	0,387	0,235	0,272
Ambrosia / амброзија						
Artemisia / пелин						
Betula / breza	0,979	0,036*	0,066	0,447	0,250	0,725
Cannabaceae / konoplja						
Carpinus / grab	0,189	0,050	0,117	0,286	0,325	0,641
Chenopociaceae / Amar. / štir						
Corylus / leska	0,024*	0,088	0,265	0,088	0,075	0,157
Cupressaceae / Taxae / čempresi	0,200	0,623	0,145	0,316	0,929	0,391
Fagus / bukva	0,205	0,606	0,348	0,688	0,722	0,080
Fraxinus / jasen	0,015*	0,651	0,597	0,494	0,523	0,999
Juglans / orah	0,125	0,504	0,558	0,601	0,753	0,056
Moraceae / dud	0,168	0,395	0,319	0,477	0,792	0,542
Pinaceae / četinari	0,658	0,252	0,117	0,220	0,639	0,831
Plantago / bokvice						
Platanus / platan	0,631	0,108	0,617	0,657	0,094	0,012*
Poaceae / trave	0,685	0,587	0,350	0,707	0,164	0,010*
Populus / topola	0,288	0,775	0,144	0,110	0,049	0,392
Quercus / hrast	0,149	0,517	0,988	0,840	0,315	0,000**
Rumex / kiselice						
Salix / vrbe	0,943	0,062	0,266	0,523	0,121	0,160
Tilia / lipe						
Ulmaceae / brest	0,018*	0,565	0,143	0,594	0,761	0,210
Urticaceae / koprive	0,206	0,152	0,144	0,631	0,867	0,372

Pearson korelacija, * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$

Подаци о обољевању становништва показују да је обољевање у *примарној* здравственој заштити од *астме* значајно повезано са полинацијом леске, јасена и бреста и високо значајно

повезано са полинацијом јове; обољевање од *ринитиса* значајно је повезано са полинацијом брезе; нема статистичке значајности за повезаност обољевања од *конјуктивитиса* са полинацијом биљака које имају алергени полен.

Обољевање у *секундарној* здравственој заштити од *конјуктивитиса* је значајно повезано са полинацијом платана и трава и високо значајно повезано са полинацијом храста; обољевање од *алергијске астме* и *алергијског ринитиса* није значајно повезано са полинацијом биљних врста чији је полен детектован у ваздуху града Панчево.

Закључак

У првој сезони полинације од 31.01.2022. - 01.05.2022. године, на територији Града Панчева са околином доминирају са највећим измереним укупним концентрацијама полен чемпреса (5417 поленових зрна /m³ ваздуха), брезе (2494 поленова зрна /m³ ваздуха) и врбе (2227 поленових зрна /m³ ваздуха).

Аеропалинолошки извештај са аеропалинолошким календаром за прву сезону полинације 2022. године приказује присутност алергених врста полена у ваздуху Града Панчева као и њихово прекорачење изнад граничних вредности за измерене концентрације полена јваора, јове, брезе, леске, граба, тиса и чемпреса, топола и врбе.

Специјалиста хигијене

Др Снежана Ђурић